

Nazwisko i imię	Kowalski Jan	Nr badania	PC95850 / 4999695
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	Antygen <i>Helicobacter pylori</i> w kale

OPIS WYNIKU BADANIA ANTYPGEN *HELICOBACTER PYLORI* W KALE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:

1. Wynik badania
2. Interpretacja wyniku badania i znaczenie diagnostyczne
3. Piśmiennictwo naukowe



Nazwisko i imię	Kowalski Jan	Nr badania	PC95850 / 4999695
PESEL	80010111000	Data pobrania materiału do badań	13.05.2026
Data urodzenia	01.01.1980	Data przyjęcia materiału do badań	13.05.2026
Adres	Kosynierska 10a/L2 60-241 Poznań	Data wykonania badania	13.05.2026
		Rodzaj badania	Antygen <i>Helicobacter pylori</i> w kale

ANTYGEN *HELICOBACTER PYLORI* W KALE

	WARTOŚĆ ODCZYTANA	WARTOŚĆ PRAWIDŁOWA
WYNIK PACJENTA	Dodatni	Ujemny

Badana próbka kału poddana została analizie immunochromatograficznej.

Informacje o widocznych zmianach właściwości próbki, które mogą mieć wpływ na wynik: **BRAK**

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE BADANIA ANTYGENU *HELICOBACTER PYLORI*

Helicobacter pylori jest bakterią, posiadającą zdolność do kolonizacji i namnożenia się w żołądku człowieka. Bakteria ta wykazuje dużą odporność, która powoduje do skutku kolonizację umożliwiając jej przetrwanie w gęstym środowisku kwasu solnego. Ponadto, odporność neutralizująca ciała obcych powoduje, że komórki posiadające przeciwciała do powstania antyciał w kierunku bakterii *Helicobacter pylori*.

W 90-95% przypadków infekcja *Helicobacter pylori* ma charakter bezobjawowy i około 10% osób zakażonych, bakteria ta może stanowić główny czynnik w rozwoju zmian patologicznych żołądka i dwunastki. Obecnie wiadomo, iż *Helicobacter pylori* odpowiada za większość przypadków choroby wrzodowej i choroby wrzodowej dwunastki. Obecnie może być również głównym czynnikiem powodującym rozwój przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastki (choroba Leptera) (1,2,3).

Bakteria antygen *Helicobacter pylori* w kale jest wykonywanym testem umożliwiającym wykazanie obecności lub braku specyficznych antygenów bakterii *Helicobacter pylori*. Wynik testu jest negatywny, gdy w próbce kału nie stwierdzono obecności antygenów *Helicobacter pylori*, a jeśli wynik pozytywny testu oznacza, że są one obecne w kale, co może wskazywać na zakażenie lub niedawno przebieg zakażenia.

Wskazania

Bakteria antygen *Helicobacter pylori* w kale jest antygenem etapem diagnostyki.

Bakterię można także powtórnie badać doustnie, przez błonę przewodzącą (zab. doustno-gutnowe).

Przebieg badania

1. Jost R, van Duynhoven YB. The role of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
2. Karaman N. The importance of the diagnosis of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter* 1996; 1: 31-40.
3. Jost R, van Duynhoven YB, Jaspers GJ. *Helicobacter pylori* and the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
4. Jost R, van Duynhoven YB, Jaspers GJ, Karaman N. *Helicobacter pylori* and the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
5. Jaspers GJ, van Duynhoven YB, Jost R. The importance of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
6. Jaspers GJ, van Duynhoven YB, Jost R, Karaman N. The importance of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
7. Jaspers GJ, van Duynhoven YB, Jost R, Karaman N. The importance of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
8. Jaspers GJ, van Duynhoven YB, Jost R, Karaman N. The importance of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.
9. Jaspers GJ, van Duynhoven YB, Jost R, Karaman N. The importance of *Helicobacter pylori* in the development of the disease. *Helicobacter* 1996; 1: 33-40.